



4º CONGRESSO REGIONAL DE

SAÚDE COLETIVA

Interprofissionalidade em saúde: desafios e potencialidades

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIA, SAÚDE E SOCIEDADE

11 a 13 de Novembro de 2020

ONLINE!

ANÁLISE TEMPORAL DA LEPTOSPIROSE NO PIAUÍ

Antonio Rosa de Sousa Neto - UFPI, Daniella Farias Almeida - UFPI,
Inara Viviane de Oliveira Sena - UFPI, Daniela Reis Joaquim de
Freitas - UFPI

INTRODUÇÃO

Doença febril infecciosa, cujo ciclo de transmissão envolve a tríade homem-animal-ecossistema, possui características clínicas inespecíficas que pode evoluir de cefaleia, mialgia, anorexia a manifestação clássica, conhecida como síndrome de Weil

OBJETIVO

Analisar os casos notificados de leptospirose no Piauí.

MÉTODO



Estudo epidemiológico descritivo e retrospectivo. Coleta em setembro de 2020

SINAN-net



SINAN-NET/DATASUS, 2009 a 2019



Variáveis analisadas foram: sexo, faixa etária, etnia, zona de residência, critério e evolução clínica


RESULTADOS

Tabela 1: Distribuição das características sociais e clínicas dos casos notificados de Leptospirose no Piauí de 2009-2019 (N=41). Teresina – PI, Brasil. 2020.

Características	n	%
Sexo		
Feminino	8	19,5
Masculino	33	80,5
Faixa Etária		
Ignorado	4	9,7
10 a 19 anos	3	7,3
20 a 39 anos	20	48,8
40 a 59 anos	11	26,9
60 ou mais	3	7,3
Etnia		
Ignorado	1	2,4
Branca	8	19,6
Preta	1	2,4
Parda	31	75,6
Zona de residência		
Ignorado	7	17,1
Urbana	20	48,8
Rural	14	34,1
Critério de confirmação		
Ignorado	1	2,4
Clínico-Laboratorial	38	92,7
Clínico-epidemiológico	2	4,9
Evolução		
Ignorado	5	12,2
Cura	35	85,4
Óbito	1	2,4

Fonte: DATASUS/SINAN. Dados exportados em 30/09/2020.

CONCLUSÃO



REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. **Guia de Vigilância em Saúde : volume único** [recurso eletrônico]. – 3ª. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2019.